PRÉVENTION RABIQUE

Généralités

- ***Virus rabique***
- Animal contagieux 5 à 7j après début des signes jusqu'au décès

- Encéphalite constamment mortelle
- TPE = vaccination +/- Ig spécifiques

- **DO** ++
- **MP**

Diagnostic

Clinique

- **Incubation longue** (20 à 90 jours)
- **Rage spastique**
- **Rage paralytique**

Examens complémentaires

- **Prélèvements salivaires**, **cornéens**
- **PL**, **biopsie cérébrale**
- **Biopsie cutanée**

CAT devant une morsure d'animal

Evaluer le risque rabique

- **Zone de prévalence**
- **ANIMAL** : **NE PAS TUER !!**
  - **Surveillance vétérinaire J3, J7, J15**
  - **Si en vie à J14** = risque nul
  - **Si décès** = biopsie cérébrale par un centre vétérinaire agréé
- **Siège de la morsure**
- **Port d'un vêtement**

Prévention

- **Animale**
- **Humaine** :
  - **Vaccination** :
    - Professionnels, voyageurs
    - 3 inj à J0, J7 et J28
    - Rappel à 1 an puis /5ans
- **DO**

Traitement spécifique

- **Centre antirabique agrée** :
  - **VACCINATION** :
    - Protocole « **Zagreb** » :
      - 2 inj à 2 sites à J0
      - 1 à J7
      - 1 à J21
    - Protocole « **Essen** » :
      - Inj à J0, J3, J7, J14, J30, J90
    - **Si vaccin préventif < 5 ans** :
      - Rappel à J0 et J3
- **SÉROTHÉRAPIE** : **Ig spécifiques < 7 jours**
  - **Blessure grave** par animal suspect
  - **Comorbidité**, **ID**
  - **Chauve-souris**